


Probeklausur zur Vorlesung
Modellierung

Für Studiengänge mit einem Modellierungsanteil von **5 ECTS**, wie zum Beispiel der Studiengang Lehramt für Haupt- und Realschule

Wintersemester 2015/2016



- Aufkleber der Klausuraufsicht -

Beachten Sie folgende Hinweise

- Die Klausur besteht aus 17 einseitig bedruckten Seiten mit 7 Aufgaben. Insgesamt können Sie 80 Punkte erreichen. Die Klammerung darf nicht gelöst werden!
- Das einzige zugelassene Hilfsmittel ist ein doppelseitig handbeschriebenes Blatt (A4).
- Schreiben Sie Lösungen möglichst in die vorgegebenen Kästen.
- Werden zu einer Aufgabe zwei Lösungen angegeben oder ist die Lösung nicht eindeutig, so gilt die Aufgabe als nicht gelöst.
- Verwenden Sie zum Schreiben keine radierbaren Stifte, verwenden Sie keine Korrekturflüssigkeiten oder Korrekturroller und schreiben Sie nicht in roter oder grüner Farbe.
- Beschriften Sie jedes Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.

Viel Erfolg !

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
maximale Punkte	10	16	10	8	12	16	8	80
erreichte Punkte								

Aufgabe 1 (Mengen & Relationen)

Teilaufgabe 1.1 (extensionale Darstellung - 3 Punkte)

Geben Sie jeweils die extensionale Darstellung der folgenden Mengen U , V und W an, sowie ihre Kardinalität. Dabei sei $A := \{1, 2\}$ und $B := \{2, 3\}$.

1. $U := Pow(Pow(\emptyset)) \cup \{\emptyset\}$

$U =$ _____ $|U| =$

2. $V := B \times (A \setminus B)$

$V =$ _____ $|V| =$

3. $W := (B \setminus \{2\}) \times (B \setminus \{3\}) \times ((A \cap B) \setminus (A \setminus \{2\}))$

$W =$ _____ $|W| =$

Teilaufgabe 1.2 (Relationen - 4 Punkte)

Geben Sie für die folgende Relation an, ob sie irreflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch, asymmetrisch, transitiv oder alternativ ist. Treffen Sie eine Aussage zu **jeder** Eigenschaft. Falls eine Eigenschaft nicht zutrifft, geben Sie ein Gegenbeispiel an.

$$R_2 = \{(x, y) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2 \mid y = \sqrt{x}\}$$

Teilaufgabe 1.3 (Funktionen - 3 Punkte)

Seien $M := \{a, b, c\}$ und $N := \{1, 2, a\}$. Kann es bijektive Funktionen $M \rightarrow N$ geben?

Falls ja, geben Sie die Anzahl k aller möglichen bijektiven Funktionen von M nach N sowie ein Beispiel für eine solche Funktion $g : M \rightarrow N$ an. Falls nein, begründen Sie, warum es keine solche Funktion geben kann.

Aufgabe 2 (Aussagenlogik)

Teilaufgabe 2.1 (Wahrheitstafel - 6 Punkte)

Gegeben seien die folgenden aussagenlogischen Formeln mit Atomen A, B, C :

$$\alpha = (A \wedge \neg B \wedge \neg C) \rightarrow A$$

$$\beta = B \vee C$$

- Vervollständigen Sie die gegebene Wahrheitstafel und ergänzen Sie alle nötigen Spalten.

A	B	C	β $B \vee C$	α $(A \wedge \neg B \wedge \neg C) \rightarrow A$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

- Welche der Eigenschaften *tautologisch*, *erfüllbar*, *falsifizierbar*, *widerspruchsvoll* gelten für α , welche nicht? Begründen Sie die Antwort.

Teilaufgabe 2.2 (Formalisieren - 4 Punkte)

Formalisieren Sie die unten stehenden Aussagen aussagenlogisch. Nutzen Sie diese Abkürzungen:

- Es gibt Fisch (F).
- Es ist Montag (M).
- Otto hat Hunger (H).
- Es gibt Pizza (P).

1. Wenn es Pizza gibt, dann ist Montag

2. Wenn Otto Hunger hat, dann gibt es Fisch oder es gibt Pizza.

3. Wenn es Fisch gibt, dann ist es entweder Montag oder Otto hat Hunger.

4. Es gibt Fisch und es ist Montag genau dann, wenn Otto Hunger hat oder es Pizza gibt.

Teilaufgabe 2.3 (Beweis - 6 Punkte)

Zeigen Sie mit Hilfe vollständiger Induktion die Verallgemeinerung von de Morgan's Gesetz für Atome a_1, \dots, a_n :

$$\neg(a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n) \approx \neg a_1 \vee \neg a_2 \vee \dots \vee \neg a_n$$

Aufgabe 3 (Prädikatenlogik)

Teilaufgabe 3.1 (Modellierung - 6 Punkte)

Wir betrachten die Situation in einem Hotel. Folgende Prädikate stehen zur Verfügung:

- $F(x)$ bedeutet, dass x ein Fußballer ist
- $T(x)$ bedeutet, dass x ein Trainer ist
- $V(x)$ bedeutet, dass x ein Verein ist
- $S(x)$ bedeutet, dass x ein Schiedsrichter ist
- $G(x, y)$ bedeutet, dass x zu y gehört
- $K(x, y)$ bedeutet, dass x y kennt

Modellieren Sie die folgenden Zusammenhänge mit den gegebenen Prädikaten:

1. Ein Fußballer kennt nicht alle Schiedsrichter.

2. Jeder Trainer kennt alle anderen Trainer, die nicht Schiedsrichter sind.

3. Zu jedem Verein gehören genau ein Fußballer und genau ein Trainer.

Teilaufgabe 3.2 (Erfüllbarkeit - 4 Punkte)

Beweisen oder widerlegen Sie:

$$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \approx (\exists xP(x)) \wedge (\exists xQ(x))$$


Hinweis: Betrachten Sie eine geeignete Interpretation.



Aufgabe 4 (Graphen)

Teilaufgabe 4.1 (ungerichtete Graphen - 4 Punkte)

Gegeben sei der folgende ungerichtete Graph $G = (V, E)$ mit Kantenmarkierung $m : E \rightarrow \mathbb{N}$:




1. Geben Sie den Graphen G als Knoten- und Kantenmenge an. (2 Punkte)

2. Existiert ein Eulerweg in G ? Falls ja, so geben Sie diesen an. Falls nein, so begründen Sie Ihre Antwort. (2 Punkte)

Teilaufgabe 4.2 (gerichtete Graphen - 4 Punkte)

Gegeben sei der folgende Graph $D = (V, E)$:



1. Geben Sie für jeden Knoten von D den Eingangs- und Ausgangsgrad an. (2 Punkte)

2. Besitzt D eine topologische Sortierung? Falls ja, so geben Sie eine solche an. Falls nein, so begründen Sie Ihre Antwort. (2 Punkte)

Aufgabe 5 (Beweisen, Modellieren)

Teilaufgabe 5.1 (Beweisen - 6 Punkte)

Beweisen Sie die folgende Aussage:

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter zusammenhängender Graph und sei $T = (V, E_T)$ ein Spannbaum von G . Zu jeder Kante $e \in E \setminus E_T$ gibt es eine Kante $e' \in E_T$, sodass $T' = (V, (E_T \setminus \{e'\}) \cup \{e\})$ ein Spannbaum von G ist. (6 Punkte)

Teilaufgabe 5.2 (Modellieren - 6 Punkte)

Homer J.S. möchte seine Abschlussarbeit in Nuklearphysik schreiben. Sein Betreuer erklärt ihm, wie das Schreiben einer Abschlussarbeit ungefähr abläuft. Es besteht im Groben aus den folgenden Aufgaben:

- Ein Einarbeitung in das Thema
- Erg Ergebnisse aufschreiben
- Exp Experimente ausführen
- Fin Finale Version erstellen (Korrekturlesen etc.)
- Grund Grundlagen-Kapitel aufschreiben
- Lit Literatursuche
- Theo Arbeit an der Theorie
- Tr Erstes Treffen mit dem Betreuer

Die Abhängigkeiten unter den einzelnen Aufgaben sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Dabei ist die Aufgabe aus Zeile i von der Aufgabe aus Spalte j abhängig genau dann, wenn die Tabelle ein „x“ in Zeile i und Spalte j enthält. So ist zum Beispiel das Aufschreiben der Ergebnisse vom Ausführen der Experimente abhängig.

	Ein	Erg	Exp	Fin	Grund	Lit	Theo	Tr
Ein	-	-	-	-	-	x	-	-
Erg	-	-	x	-	-	-	-	-
Exp	x	-	-	-	-	-	-	-
Fin	-	x	-	-	x	-	x	-
Grund	x	-	-	-	-	-	-	-
Lit	-	-	-	-	-	-	-	x
Theo	x	-	-	-	-	-	-	-
Tr	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Modellieren Sie den Sachverhalt der Tabelle als gerichteten Graphen $D = (V, A)$. Geben Sie dazu zunächst an, wie die Mengen V und A definiert sind. Erklären Sie, wann eine Kante (u, v) in A enthalten ist. (2 Punkte)

2. Zeichnen Sie den Graphen D . (2 Punkte)



3. Homer versucht einen Arbeitsplan zu erstellen. Gesucht ist eine Reihenfolge r für die Abarbeitung der Aufgaben, die alle Abhängigkeiten berücksichtigt.

Stellen Sie r in folgender Tabelle als eine injektive Abbildung von der Menge der Aufgaben nach \mathbb{N} dar, so dass für jeweils zwei Aufgaben a_1 und a_2 gilt: Falls a_2 von a_1 abhängt, dann gilt $r(a_1) < r(a_2)$. (2 Punkte)

Leistung a_i	Ein	Erg	Exp	Fin	Grund	Lit	Theo	Tr
Reihenfolge $r(a_i)$								

Aufgabe 6 (Sprachen)

Teilaufgabe 6.1 (Grammatiken - 8 Punkte)

Gegeben sei die folgende Grammatik $G = (T, N, P, A)$ in Backus-Naur-Form mit $T = \{0, 1\}$, $N = \{A\}$ und

$$P = \{A ::= 00A1 \mid 1A00 \mid 0A01 \mid 10A0 \mid \epsilon\}.$$

1. Ist das Wort $w_1 = 0010011$ in $L(G)$ enthalten? Begründen Sie ihre Antwort. (4 Punkte)

2. Zeichnen Sie einen Ableitungsbaum für das Wort $w_2 = 001001001 \in L(G)$. (4 Punkte)



Teilaufgabe 6.2 (Grammatiken - 8 Punkte)

Gegeben sei die Sprache

$$L_{abc} = \{\omega \in \{a, b, c\}^* \mid \omega = a^n b^m c^{n-m} \text{ mit } n, m \in \mathbb{N}_0 \text{ wobei } n \geq m\}.$$

Geben Sie eine kontextfreie Grammatik G_{abc} als 4-Tupel $G_{abc} = (T, N, P, S)$ mit $L(G_{abc}) = L_{abc}$ an.

Lösungen mit mehr als 8 Ableitungsregeln werden mit 0 Punkten bewertet.

Aufgabe 7 (Automaten)

Teilaufgabe 7.1 (DFAs - 8 Punkte)

Gegeben Sei die Sprache

$$L_{ab} = \{\omega \in \{a, b\}^* \mid \omega \text{ enthält die Zeichenfolge } abab \text{ und die Zeichenfolge } bab\} .$$

Zeichnen Sie einen deterministischen endlichen Automaten (DFA) der L_{ab} akzeptiert.
Lösungen mit mehr als 8 Zuständen werden mit 0 Punkten bewertet.